СТОМАТОЛОГИЯ
Доктора Лютикова

# ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТЕВЫМИ ВКЛАДКАМИ

(разборными, не разборными, из кобальт хрома или из драг металла, стекловолокна)

**1. Культевые вкладки используются для восстановления высоты коронки зуба для последующей установки искусственной коронки. Фиксация культевой вкладки происходит за счет того что часть вкладки устанавливается в корневой канал зуба с помощью цементов.**

**2. При препарировании корневых каналов утончается стенки корневых каналов, что может привести к расколу корня. Кроме этого коэффициент эластичности корня зуба не соответствует коэффициенту эластичности самой вкладки и это так же может привести к расколу корня зуба. Так же, завышение по прикусу коронки может привести к перегрузу зуба и его потери. Нарушение контактом между зубами приводит к застреванию, скапливанию пищи в межзубном пространстве – что приведет к гингивиту, затем атрофии слизистой и кариесу корня или атрофии костной ткани – что в свою очередь приведет к потере зуба. Плохо пролеченные корневые каналы, при жевательной нагрузке могут повторно воспалиться.**

**3. Гигиена полости рта как при своих зубах.**
**Использовать как зубные щетки и пасты, так и ершики, флоссы, ирригаторы. Два раза ( утро-вечер ) чистить зубы с помощью зубной щетки и пасты. После приема пищи, прополаскивать полость рта, можно применять ополаскиватели рта. Обязательно чистить флоссами межзубные пространства.**

*Чтобы открыть ссылку, наведите камеру Вашего смартфона на qr - код

НАША ГРУППА В ТЕЛЕГРАМЕ

НАШ САЙТ:

СТОМАТОЛОГИЯ
Доктора Лютикова

# ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТЕВЫМИ ВКЛАДКАМИ

(разборными, не разборными, из кобальт хрома или из драг металла, стекловолокна)

**4. Следить за жевательной нагрузкой, не допускать гиперконтакта или перегруза коронки. Это может привести к расколу корня зуба или потери костной ткани и соответственно потери зуба.**
**5. Не допускать боковых нагрузок на зубы с культевыми вкладками, ударов, механического воздействия и тд. Это может привести к расколу корня зуба или потери костной ткани и соответственно потери зуба.**
**6. Раз в полгода приходить на осмотр и возможной коррекции коронки по прикусу.**
**7. Профессиональная гигиена полости рта – один раз в 6 месяцев. Для улучшения прилегания искусственной коронки к слизистой.**
**8. Следить за межзубными контактами - в случае возникновения кровоточивости межзубного сосочка, постоянного попадания пищи между зубами – необходимо обратиться к стоматологу. В противном случае вы можете потерять зуб.**
**9. Рентген контроль раз в год (либо реже, в зависимости от состояния слизистой и костной ткани вокруг зуба).**
**10. Замена искусственной коронки раз в 5-7 лет (зависит от вашей эксплуатации коронок и гигиены полости рта), замены культевой вкладки по показаниям. Гарантия на культевую вкладку и срок эксплуатации устанавливается 6 месяцев , с возможным продлением еще на 6 месяцев при соблюдении рекомендаций врача.**

*Чтобы открыть ссылку, наведите камеру Вашего смартфона на qr - код

НАША ГРУППА В ТЕЛЕГРАМЕ

НАШ САЙТ: